

# argenfrut RV

## Descripción

**argenfrut RV** es un aceite mineral emulsionable, de rango estrecho, rotura rápida y uso estival especialmente desarrollado para el control eficiente de insectos, ácaros y ciertos hongos como la Mancha Grasienta (Greasy Spot) en cítricos.

**argenfrut RV** actúa por contacto produciendo la muerte del insecto por asfixia.

Dado su poder disolvente de la quitina que recubre los desoves de los insectos, posee un marcado efecto ovicida previniendo de esta manera las reinfestaciones.

Por otro lado, al producir la muerte del insecto por asfixia, se mantienen vivos los depredadores naturales de los mismos (*Aphytis melinus*), consiguiendo de esta manera un control eficaz y económico de las plagas más habituales.

## Aplicación

**argenfrut RV** debe aplicarse con equipos de alto o bajo volumen, con presiones de trabajo no menores a 350 libras/pulgada<sup>2</sup> y provistos de agitadores que roten a no menos de 150 r.p.m. para mantener la emulsión homogénea durante toda la aplicación.

Para un uso totalmente exitoso se aconseja:

- No pulverizar en períodos de excesivo calor o de bajas temperaturas (menores a 5° C). En días muy calurosos, proceder a efectuar las pulverizaciones preferentemente antes de las 10 hs o después de las 15 hs. También en este caso es recomendable realizar las aplicaciones en horas nocturnas.
- Durante el tiempo que dure la aplicación, debe mantenerse constante la marcha de los agitadores así como la presión indicada, para asegurar la homogeneidad de la emulsión.
- No pulverizar cuando la planta sufra sequías o cualquier otra forma aguda de estrés.
- El lapso mínimo entre dos aplicaciones de aceite debe ser de 30 días.
- El producto no requiere un período de carencia.
- Separar las aplicaciones de aceite de las de azufre, polisulfuro de calcio o similar por un período de 4 semanas como mínimo.

## Datos sobre la Aplicación

| CULTIVO       | DOSIS   | MOMENTO DE APLICACIÓN  |
|---------------|---|--|
| <b>Citrus</b> | De 40 a 60 litros de producto por hectárea.<br>Cuando se aplica con equipos de alto volumen, usar de 1,25 a 1,5 litros de producto por cada 100 litros de emulsión. | Fines de primavera y verano, cuando la fruta tiene, aproximadamente el tamaño de una nuez. |

## Plagas que controla

- Acaro del tostado (*Phyllocoptruta oleivorus*)
- Arañuela parda (*Bryobia praetiosa*)
- Cochinilla acanalada australiana (*Icerya purchasi*)
- Cochinilla blanca de los citrus (*Unaspis citri*)
- Cochinilla blanda (*Coccus hesperidum*)
- Cochinilla coma o serpeta (*Myllococcus beckii*)
- Cochinilla del aguairabay (*Ceroplastes grandis*)
- Cochinilla del Delta (*Lecanium deltae*)
- Cochinilla harinosa de los citrus (*Pseudococcus citri*)
- Cochinilla negra circular (*Chrysomphalus aonidun*)
- Cochinilla negra del olivo (*Saissetia oleae*)
- Cochinilla roja australiana (*Aonidiella aurantii*)
- Cochinilla roja común (*Chrysomphalus dictyospermi*)
- Mancha Grasienta (Greasy Spot)
- Moscas blancas (*Aleurothrixus floccosus*)
- Pulgones de los citrus (*Toxoptera aurantii* y *Aphis gossypii*)
- Trips (*Frankliniella* spp)

**NO TÓXICO PARA ABEJAS, ANIMALES SILVESTRES, DOMÉSTICOS O PECES.**

# argenfrut RV

## ESPECIFICACIONES

| ENSAYO                               | MÉTODO ASTM | VALOR TÍPICO |
|--------------------------------------|-------------|--------------|
| COLOR                                | D-1500      | 0.5          |
| ESCURRIMIENTO, ° C                   | D-97        | -18          |
| GRAVEDAD, API                        | D-1298      | 33.5         |
| DENSIDAD @ 15° C, Kg/dm <sup>3</sup> | D-4052      | 0.8570       |
| LIBRAS POR GALÓN                     | D-1250      | 7.14         |
| RESIDUO NO SULFONABLE, %             | D-483       | > 95.0       |
| DESTILACIÓN @ 10 mm Hg, 50% °C       | D1160       | 225          |
| DESTILACIÓN @ 10 mm Hg, 10-90% °C    | D1160       | 40           |

REGISTRO SENASA N° 31072